

EXPERIÊNCIAS CLÍNICAS DERMATOLOGIA




www.vetoquinol.pt





ÍNDICE

DERMATOLOGIA CANINA



DERMATOLOGIA FELINA





Anamnese:


West Highland White Terrier de 6 anos de idade com dermatite atópica tratada atualmente com oclacitinibe + shampoos.

Principal motivo da consulta: Dermatite piotraumática da cauda.

Plano de ação: PHOVIA + oclatinib + shampoo antisséptico.

Duração: 2 semanas.

DERMATITE PIOTRAUMÁTICA



Anamnese:

Labrador de 5 anos de idade com dermatite atópica atualmente tratada com lokivetmabe e oclacitinibe.

Principal motivo da consulta: Dermatite piotraumática aguda recorrente e recidivante (não tolerada por tratamento antimicrobiano e anti-inflamatório tópico)

Plano de ação: PHOVIA + lokivetmab + oclacitinib.

Duração: 2 semanas.

Acompanhamento: Sem recidiva em 2 meses.

DERMATITE PIOTRAUMÁTICA



Anamnese:

Cão macho, sem raça definida, 3 anos de idade, sem antecedentes dermatológicos relevantes.

Principal motivo da consulta: Dermatite piotraumática (zona sacro).

Plano de ação: PHOVIA (monoterapia).

Duração: 1 semana.



DERMATITE PIOTRAUMÁTICA



Anamnese:

Cão pastor Maremmano, macho, 4 anos, sem antecedentes dermatológicos relevantes.

Principal motivo da consulta: Dermatite piotraumática (região cabeça-pescoço).

Plano de ação: PHOVIA (monoterapia).

Duração: 2 semanas.



FÍSTULAS PERIANAIS/FURUNCULOSE



Especificamente, se o caso exigir, PHOVIA deve ser continuado pelo menos 1 ou 2 semanas após a resolução clínica

- Anamnese:** Pastor Alemão de 7 anos com alterações digestivas crônicas e fistula perianal.
- Principal motivo da consulta:** Fístula perianal crônica que responde parcialmente à ciclosporina e ao tacrolimus.
- Plano de ação:** PHOVIA + ciclosporina (2 mg / kg / SID) e tacrolimus (em dias alternados).
- Duração:** 3 semanas.
- Acompanhamento:** A cura completa foi observada na semana 3. Devido à falta de cumprimento por parte do tutor, a aplicação de Phovia foi interrompida na semana 3. Na semana 9, foi observada uma recidiva da condição.

FÍSTULAS PERIANAIS/FURUNCULOSE



"O PHOVIA pode ser integrado como parte da terapia multimodal no tratamento de fístula perianal e permite reduzir a administração de outros fármacos"

Anamnese:

Pastor Alemão de 7 anos com alterações digestivas crônicas e fístula perianal.

Principal motivo da consulta:

Fístula perianal crônica que responde parcialmente à ciclosporina e ao tacrolimus.

Plano de ação:

PHOVIA + ciclosporina (8 mg/kg/SID) + tacrolimus (em dias alternados).

Duração:

5 semanas.

Acompanhamento:

No final das 5 semanas o cão estava completamente curado e reduziu-se a ciclosporina a duas vezes por semana



Anamnese:


Cocker inglês de 4 anos com furunculose interdigital secundária a corpo estranho (espiga), com evolução de 1,5 anos.

Principal motivo da consulta: Furunculose interdigital recorrente crónica.

Plano de ação: Phovia + shampoo antisséptico.

Duração: 2 semanas.

Acompanhamento: Sem recaídas em 3 meses após a interrupção do Phovia.



Anamnese:

Staffordshire Bull Terrier, 5 anos, com furunculose interdigital crónica e pododermatite.

Principal motivo da consulta: Furunculose interdigital.

Plano de ação: PHOVIA.

Duração: 6 semanas.

FURUNCULOSE INTERDIGITAL/PODODERMATITE



Anamnese:

Buldogue francês de 2 anos com dermatite atópica grave atualmente tratada com oclacitinib.

Principal motivo da consulta: Furunculose interdigital presente há 2 semanas.

Plano de ação: PHOVIA + shampoos antissépticos + oclatinibe.

Duração: 4 semanas.



Anamnese:

Bull Mastiff de 2 anos de idade com pododermatite em evolução há 1 ano.

Principal motivo da consulta: Furunculose interdigital crónica respondendo parcialmente a antibióticos sistémicos, antissépticos tópicos, esteróides e oclacitinib.

Plano de ação: PHOVIA + shampoos antissépticos.

Duração: 4 semanas.



Anamnese:

Border Collie de 10 anos com leishmaniose.

Principal motivo da consulta: Podofurunculose crônica recorrente presente há 6 anos. Vários ciclos de antibióticos + cortisona e várias intervenções cirúrgicas com resultados parciais.

Plano de ação: PHOVIA (monoterapia).

Duração: 2 semanas.

Acompanhamento: Após 1 semana, o proprietário relatou que Speedy havia sido capaz de apoiar a pata (anteriormente não era). Clinicamente, a inflamação foi reduzida em aprox. 50% e apenas sensibilidade mínima foi observada.



Anamnese:

Boxer de 4 anos de idade com dermatite atópica e furunculose interdigital recorrente crônica em tratamento com lokivetmab e imunoterapia específica com alérgenos. O cão é regularmente tratado com esteroides orais para controlar a pododermatite.

Principal motivo da consulta: Furunculose interdigital crônica.

Plano de ação: PHOVIA + lokivetmab.

Duração: 10 semanas.

FURUNCULOSE INTERDIGITAL/PODODERMATITE



Anamnese:

Mastim italiano de 2 anos com pododermatite crónica, presente há 8 meses.

Principal motivo da consulta: Furunculose interdigital crónica que responde a antibióticos sistémicos, antissépticos tópicos e esteroides, mas recidiva a cada 4 semanas após o tratamento.

Plano de ação:

PHOVIA + shampoos antissépticos.

Duração:

4 semanas.

Acompanhamento:

Sem recidivas 2 meses após o último tratamento com PHOVIA.



Anamnese: Doberman 5 anos.

Principal motivo da consulta: Pododermatite.

Plano de ação: PHOVIA (monoterapia).

Duração: 4 semanas.

FURUNCULOSE INTERDIGITAL/PODODERMATITE



Anamnese:

Cão Bulldog Inglês, 2 anos.

Principal motivo da consulta:

Furunculose interdigital crónica recorrente a cada 4-6 semanas, com resposta parcial a antibióticos sistémicos e antissépticos tópicos.

Plano de ação:

PHOVIA + shampoo antisséptico (uma vez por semana).

Duração:

6 semanas.

Acompanhamento:

Sem recorrência um mês após o término da terapia.

FURUNCULOSE INTERDIGITAL/PODODERMATITE



- Anamnese:** Cão cruzado Boxer, fêmea esterilizada, 5 anos, com dermatite atópica (prurido ou otite de repetição).
- Principal motivo da consulta:** Furunculose interdigital recorrente, resposta temporária a antibióticos e corticosteróides sistêmicos e tópicos.
- Citologia:** Inflamação piogranulomatosa com *coccus* e bacilos.
- Plano de ação:** PHOVIA (monoterapia).
- Duração:** 6 semanas.

PIODERMA PROFUNDO



D0



D28

Anamnese:

Cão de 4 anos com piodermatite profunda crónica.

Principal motivo da consulta: Piodermatite profunda crónica das extremidades que não responde ao tratamento com antibióticos.

Plano de ação: PHOVIA (monoterapia).

Duração: 4 semanas.

PIODERMA PROFUNDO



- Anamnese:** Pastor Alemão de 6 anos com dermatite atópica.
- Principal motivo da consulta:** Piodermatite profunda multifocal.
- Plano de ação:** PHOVIA + antibiótico sistêmico.
- Duração:** 4 semanas (observou-se uma grande melhoria nas lesões tratadas com PHOVIA em comparação com as não tratadas).

PIODERMA PROFUNDO



Anamnese: Cão de 2 anos com escrotite ulcerativa dolorosa crônica e postite.

Principal motivo da consulta: Escrotite e postite ulcerativas e dolorosas crônicas.

Diagnóstico histopatológico: Penfigóide benigno da mucosa. A remissão parcial apenas foi alcançada com esteroides, ciclosporina, micofenolato de mofetil e tetraciclina mais nicotinamida. A postite foi completamente curada com nicotinamida e oclacitinib. A escrotite não respondeu ao tratamento.

Plano de ação: PHOVIA + nicotinamida e oclacitinib.

Duração: 3 semanas.

PARTE I - ÁREA DORSAL (próxima página Área do cotovelo)



Anamnese: Cão Pastor Belga Malinois, 7 anos.

Principal motivo da consulta: Pioderma profundo. Lesões recorrentes no dorso e cotovelo. Anteriormente tratado com esteroides orais, antibióticos orais e antissépticos tópicos, obtendo melhora parcial.

Cultura e sensibilidade: *Staphylococcus pseudintermedius* sensível à maioria dos antibióticos. A cefalexina oral causou efeitos colaterais gastrointestinais significativos e foi descontinuada após poucos dias de administração.

Plano de ação: PHOVIA + shampoo antisséptico.

Duração: 4 semanas.

PARTE II - ÁREA DO COTOVELO



Anamnese: Cão Pastor Belga Malinois, 7 anos.

Principal motivo da consulta: Pioderma profundo. Lesões recorrentes no dorso e cotovelo.

PIODERMA PROFUNDO



Anamnese: Cão Boxer, 7 anos, com dermatite atópica.

Principal motivo da consulta: Pioderma profundo. Lesões recorrentes com resposta parcial a antibióticos (amoxicilina/ácido clavulânico e sulfonamidas) e antissépticos tópicos. Atualmente em tratamento com ciclosporina oral e shampoo antisséptico.

Plano de ação: PHOVIA + shampoo antisséptico semanal.



Duração: 5 semanas.

PIODERMA PROFUNDO



- Anamnese:** Cão Bull Terrier, macho inteiro, 4 anos de idade.
- Principal motivo da consulta:** Pioderma profundo recorrente. Lesões recorrentes com resposta parcial a antibióticos e corticosteróides. Atualmente em tratamento com ciclosporina oral e shampoo antisséptico.
- Citologia:** Macrófagos espumosos muito ativos, neutrófilos e eosinófilos. Poucos *coccus* foram observados. Alguns queratinócitos com aspecto cornificado, sem evidências de atipias como persistência de núcleo grande, anisocitose.
- Plano de ação:** PHOVIA + amoxicilina/ac. clavulânico (2 semanas) + ciclosporina (longo prazo).
- Duração:** 8 semanas.

PIODERMA PROFUNDO



Anamnese: Cão Cocker Spaniel, 14 anos.

Principal motivo da consulta: Pioderma profundo recorrente. Queiloplastia prévia, com melhora parcial.

Citologia: Bacilos y *Malassezia pachydermatis*.

Plano de ação: PHOVIA (monoterapia).

Duração: 4 semanas.

PIODERMA PROFUNDO



Anamnese:

Cão cruzado, 2 anos.

Principal motivo da consulta: Pioderma profundo recorrente do escroto. Anteriormente tratado com amoxicilina/ac. ácido clavulânico durante 30 dias.

Citologia:

Infiltrado inflamatório piogranulomatoso com *coccus*.

Plano de ação:

PHOVIA (monoterapia).

Duração:

4 semanas.






- Anamnese:** Cão Doberman de 5 anos de idade com dermatite atópica e enteropatia crônica.
- Principal motivo da consulta:** Pioderma profundo localizado no ponto de pressão.
- Plano de ação:** PHOVIA (monoterapia).
- Duração:** 2 semanas.



PIODERMA PROFUNDO LOCALIZADO - PONTOS DE PRESSÃO



- Anamnese:** Cão cruzado, 6 anos.
- Principal motivo da consulta:** Pioderma profundo localizado recorrente - pontos de pressão. Resposta parcial em tratamentos anteriores.
- Citologia:** Infiltrado inflamatório piogranulomatoso com *coccus*.
- Plano de ação:** PHOVIA (monoterapia).
- Duração:** 4 semanas.



Anamnese:

Cão com dermatite acral por lambedura (infetada e crónica).

Principal motivo da consulta: Resposta parcial a antibióticos sistémicos e antissépticos tópicos. O tratamento com antibióticos sistémicos foi interrompido antes do tratamento com PHOVIA devido à má adesão do tutor.

Plano de ação:

PHOVIA + shampoo antisséptico.

Duração:

Melhoria clínica rápida após 7 dias e redução de 50% na semana 4.



- Anamnese:** Cão.
- Principal motivo da consulta:** Dermatite acral por lambedura (ferida inicial - mordedura).
- Tratamentos anteriores:** Oclacitinib e AINE, sem alterações, corticoides, 2 semanas: sem alterações.
- Plano de ação:** PHOVIA + corticoide 1 semana + pomada.
- Duração:** 2 semanas.



Anamnese:

Cão Clumber Spaniel, 6 anos.

Principal motivo da consulta: Dermatite acral crônica por lambedura secundária a ansiedade generalizada. Anteriormente tratado com antibióticos e clomipramina associados a técnicas de modificação de comportamento sem sucesso.

Cultura e sensibilidade: *Staphylococcus pseudintermedius* multirresistente.

Plano de ação: PHOVIA + clomipramina + técnicas de modificação de comportamento.

Duração: 5 semanas.



"PHOVIA dentro da abordagem multimodal para o tratamento de dermatose inflamatória crônica refratária"

Anamnese:

Gato de 3 anos com dermatite eosinofílica desde muito jovem.

Principal motivo da consulta: Placas eosinofílicas crônicas que evoluem ao longo de 2 anos. Numerosos tratamentos imunossupressores/anti-inflamatórios (esteroides, ciclosporina) e antibióticos administrados no passado com resposta parcial.

Plano de ação:


PHOVIA + cetirizina 1 mg/kg + metilprednisolona 0,55 mg/kg.

Duração:

2 semanas.

Acompanhamento:

Na semana 4, inicia-se a terapia a laser (660, 800, 905 e 970 nm) durante 1 mês.



Anamnese: Gato, Shorthair Europeu, 6 meses.

Principal motivo da consulta: Dermatite ulcerativa idiopática felina. Lesão no pescoço presente há um mês.

Plano de ação: PHOVIA (monoterapia).

Duração: 2 semanas.

DERMATITE ULCERATIVA IDIOPÁTICA FELINA



Anamnese:

Gato, doméstico de pêlo curto, sexo feminino, 2 anos.

Principal motivo da consulta: Dermatite ulcerativa idiopática felina no pescoço. Lesão de 6 meses de evolução, sem resolução após diversas abordagens médicas e cirúrgicas, obtendo apenas uma resolução parcial.

Tratamentos médicos prévios: Antibióticos sistêmicos e tópicos, corticosteróides tópicos e sistêmicos, oclacitinib, gabapentina, lavagens, diversos tipos de curativos e colares de proteção.

Histopatologia: Consistente com dermatite ulcerativa idiopática felina.

Plano de ação: PHOVIA + oclacitinib + gabapentina + mupirocina + pomada cicatrizante.

Duração: 5 semanas.

PHOVIA

Reparação cutânea por estimulação lumínica



Referencias:

Ferroni L., et al. (2020), Marchegiani A., et al. (2019), Salvaggio A., et al. (2020), Marchegiani, A., Spaterna A., et al. (2021),
Marchegiani A., Fruganti. A., et al. (2021), Marchegiani A., et al. (2018), Apostolopoulos N., Mayer U.,(2020), Marchegiani, A., et al. (2020).

www.vetoquinol.pt

www.phovia.pt

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

0398CA