

EXPERIÊNCIAS CLÍNICAS GESTÃO DE FERIDAS



www.vetoquinol.pt



ÍNDICE

GESTÃO DE FERIDAS





Anamnese:

Cão de raça indeterminada de 2 anos.

Principal motivo da consulta: Ferida operatória infetada e purulenta após ovariectomia. Desbridamento cirúrgico da ferida + 2 antibióticos diferentes + AINEs.

Cultura e sensibilidade: *Staphylococci pseudintermedius* multirresistente com suscetibilidade ao florfenicol.

Plano de ação: PHOVIA + florfenicol.

Duração: 3 semanas.



- Anamnese:** Cão.
- Principal motivo da consulta:** Deiscência em sutura cirúrgica.
- Plano de ação:** PHOVIA + fecho cirúrgico.
- Duração:** 1 sessão (2 aplicações consecutivas).
- Seguimento:** 4 dias após a aplicação de PHOVIA, a área afetada estava pronta para o fecho cirúrgico.

FERIDAS CIRÚRGICAS



Anamnese:

Cão de 4 anos com ferida crónica que não cicatriza após excisão de osteocondroma.

Principal motivo da consulta: Ferida crónica com 3 anos de evolução. Foram estabelecidos vários ciclos de antibióticos, antissépticos e pensos de mel. A ferida é coberta com uma prótese protetora.

Plano de ação:

PHOVIA + pensos de mel.

Duração:

8 semanas.

FERIDAS CIRÚRGICAS



Anamnese:

Cão Border Collie, 10 meses.

Principal motivo da consulta: Deiscência de ferida cirúrgica, cicatrização por segunda intenção.

Plano de ação: PHOVIA (monoterapia).

Duração: 2 semanas.



FERIDAS TRAUMÁTICAS



Anamnese:

Beagle 4 anos.


Principal motivo da consulta: Ferida por atropelamento por veículo.

Plano de ação: PHOVIA + antibioterapia uma semana (penicilina).

Duração: 5 semanas. O tutor refere que o animal apresenta menos dor desde a primeira sessão.



FERIDAS TRAUMÁTICAS



Anamnese: Caniche, 15 anos.

Principal motivo da consulta: Ferida após mordedura e necrose dérmica (removida cirurgicamente).

Plano de ação: Phovia + 2 semanas de antibiótico (cefalexina) + terapia tópica (pomadas) + pensos.

Duração: 5 semanas.



FERIDAS TRAUMÁTICAS



Anamnese:

Border Collie, macho, não castrado, 1,5 anos de idade.

Principal motivo da consulta: Automutilação severa (três das quatro extremidades) por um transtorno obsessivo compulsivo + ansiedade por separação, agravada por uma possível neuropatia sensorial. Duração indeterminada.

Plano de ação:

Transtorno obsessivo compulsivo e ansiedade por separação: gabapentina, fluoxetina e Zylkene.

Automutilação: PHOVIA + antibióticos + anti-inflamatórios.

Duração:

5 semanas.

FERIDAS TRAUMÁTICAS



Anamnese: Cão.

Principal motivo da consulta: Feridas após atropelamento.

Plano de ação: PHOVIA + antibiótico.

Duração: 3 semanas.





Anamnese:

Cão Cocker Spaniel Americano, 5 anos, com hipotireoidismo.

Principal motivo da consulta: Abscesso crônico de cauda com resposta parcial a antibióticos sistêmicos e antissépticos tópicos.

Plano de ação:

PHOVIA (monoterapia).

Duração:

2 semanas.



FERIDAS TRAUMÁTICAS



Anamnese: Cão Pastor Belga.

Principal motivo da consulta: Ferida traumática extensa e necrótica por mordida de gato. Desbridamento cirúrgico inicial e manejo por segunda intenção.

Plano de ação: PHOVIA (monoterapia).

Duração: 15 semanas.

FERIDAS TRAUMÁTICAS



Anamnese:

Coelho, 3 anos.

Principal motivo da consulta: Abscessos subcutâneos e ulcerações dérmicas (escaldadura urinária).
Iniciou-se com abordagem cirúrgica.

Citologia:

Crescimento de *Staphylococcus* coagulase-negativa e *Streptococcus* alfa hemolítico em meio enriquecido.

Plano de ação:

PHOVIA + enrofloxacina.

Duração:

4 semanas.

PHOVIA

Reparação cutânea por estimulação lumínica



Referencias:

Ferroni L., et al. (2020), Marchegiani A., et al. (2019), Salvaggio A., et al. (2020), Marchegiani, A., Spaterna A., et al. (2021),
Marchegiani A., Fruganti. A., et al. (2021), Marchegiani A., et al. (2018), Apostolopoulos N., Mayer U.,(2020), Marchegiani, A., et al. (2020).

www.vetoquinol.pt

www.phovia.pt

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

0399CA